

Magnuszowice 53a
49-156 Gracze
e-mail: biuro@modernhatch.eu

Wskaźnik powyżej 370 - bardzo dobry
Wskaźnik od 340-370 - dobry
Wskaźnik od 300-339 - dostateczny
Wskaźnik poniżej 300 - niezadawalający

Tydzień	Upadki (%)	Selekcja (%)	Waga (g)	Ilość spożytej paszy (kg)	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
Razem					

Data	Rodzaj paszy	Ilość (t)	Producent	Inne
Ogółem				

Ubojnia	Data uboju	Ilość sztuk	Waga żywca	Średnia waga
Podsumowanie				

Lp.	Wzór	Parametry	Przykład	Wynik
1		% upadków	3,9%	
2		% przeżycia	96,1%	
3		ilość dni tużu	42	
4		ilość sprzedanych ptaków (szt.)	15000	
5		masa sprzedanego żywca (kg)	33750	
6	5/4	masa ciała (kg)	2,70	
7		ilość spożytej paszy (kg)	58950	
8	7/5	spożycie paszy na 1 kg masy ciała (kg)	1,65	
9	$((2 \times 6) / (3 \times 8)) \times 10000$	Wskaźnik produktywny EWW*	374	

DOBRE PRAKTYKI PRODUKCJI

Producent
Data wstawienia
Nr hali
Ilość sztuk
Rasa
Wiek stada rodzicielskiego
Obsada (szt/m2)

Środowisko w dniu wstawienia:

- Temperatura powietrza około 33°C (w zależności od zachowania stada). Pisklęta z młodych stad o wadze 35-39g zwykle wymagają wyższej temperatury ok 34-35°C.
- Temperatura ściółki 30°C.
- Temperatura posadzki (beton) minimum 28°C.
- Tuż przed przyjęciem piskląt należy przewietrzyć budynek (na czas przyjęcia piskląt temperatura może spaść nawet do 28°C). Stężenie CO2 nie powinno przekraczać 3000 ppm.
- Wilgotność optymalna 40-60%. Przy wilgotności poniżej 40% temperatura powietrza powinna wynosić około 34-35°C, a przy wilgotności powyżej 60% około 32°C.
- Minimalny ruch powietrza na hali.

Pamiętajmy, że brojlery tracą energię potrzebną do zwiększenia masy ciała na ogrzewanie i schładzanie organizmu. Zadbajmy o właściwą temperaturę na kurniku dostosowaną do wieku, masy ptaka i stanu upierzenia!

Zadawanie paszy w dniu wstawienia:

- Dobre efekty daje papier po obu stronach linii pojenia rozłożony na około 50% powierzchni kurnika. Na papier sypiemy paszę (najlepiej Prestarter) w łącznej dawce 70g/sztukę przez minimum 4 dni, uzupełniając 3-4 razy na dobę.
- Jako dodatkowe źródło paszy można stosować także tace papierowe.
 - Karmidła muszą być wypełnione paszą po brzegi i powinny być ustawione bezpośrednio na posadzce lub zagłębione w ściółce, umożliwiając pisklętom jak najłatwiejszy dostęp do paszy.

Pamiętajmy, że 1 gram pobranej paszy przez pisklę w pierwszym tygodniu życia, to blisko 1 gram przyrostu masy ciała. Taka konwersja zdarza się tylko podczas tego okresu. Warto to wykorzystać!

Pojenie:

- 1-2 godziny przed wstawieniem należy przepłukać linie pojenia i napełnić poidła świeżą wodą.
- Smoczki ustawiamy na wysokość głowy pisklęcia (piskle pijąc ma mieć dziubek skierowany do smoczka ku górze pod kątem 45°). Wysokość linii pojenia regulujemy minimum jeden raz dziennie, dostosowując ją do wzrostu ptaków.
- Ciśnienie wody należy ustawić w taki sposób, aby na końcu smoczka była widoczna kropla. Ułatwia to pisklętom odnalezienie źródła wody.

Dbajmy o jakość wody przeprowadzając jej higienizację podczas tuczu, minimum 4 razy w tygodniu. Takie działanie zapobiegnie namnażaniu się patogennych drobnoustrojów w liniach pojenia. Ptaki piją prawie dwa razy więcej wody niż zjadają paszy!

[illegible]